

บทที่ 5 ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ (The Representative Elements)

หัวข้อ

1. ธาตุหมู่ IA-VIIIA
2. สารประกอบธาตุหมู่ IA-VIIIA
3. สมบัติต่างๆของธาตุหมู่ IA-VIIIA

หนังสืออ้างอิง


1. เคมี 2, ทบวงมหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 3, พ.ศ. 2532.
2. เคมี 2, Raymond Chang แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร. นกมล ไชยคำ, สำนักพิมพ์ท็อป/แมคกรอฮิล, 2547.

ผู้สอน อ.ดร. รัชดาภรณ์ ปันทะรส

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ คือ ธาตุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนบรรจุใน s และ p ออร์บิทัล โดยที่ใน d และ f ออร์บิทัลอาจจะไม่มีอิเล็กตรอนอยู่เลยหรือมีบรรจุอยู่เต็ม ไม่ว่าจะป็นอะตอมหรือไอออน

ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ



Group IA (Alkali metal) ns<sup>1</sup>

สมบัติความเป็นกรดเบสของธาตุหมู่ IA มักเป็นเบส จึงเรียกว่า alkali metal

โลหะอัลคาไลมีสีเงิน Cs มีสีทอง

1	H	Hydrogen	(1.007, 1.008)
3	Li	Lithium	(6.941, 6.957)
11	Na	Sodium	(22.99)
19	K	Potassium	(39.10)
37	Rb	Rubidium	(85.47)
55	Cs	Cesium	(132.9)
87	Fr	Francium	



\* ธาตุก็มีมันครั้งดี

Elements		Source	Method of preparation
Li	Lithium	Silicate minerals เช่น spodumene (LiAl(S <sub>2</sub> O <sub>6</sub> ))	Electrolysis of molten LiCl
Na	Sodium	NaCl	Electrolysis of molten NaCl
K	Potassium	KCl	Electrolysis of molten KCl
Ru	Rubidium	Impurity in lepidolite, Li <sub>2</sub> (F,OH) <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	Reduction of RbOH with Mg and H <sub>2</sub>
Cs	Cesium	Pollucite (Cs <sub>4</sub> Al <sub>4</sub> Si <sub>9</sub> O <sub>26</sub> ·H <sub>2</sub> O)	Reduction of CsOH with Mg and H <sub>2</sub>

●เป็นโลหะที่ว่องไว จึงไม่พบโลหะหมู่นี้เป็นธาตุอิสระ แต่ปรากฏในรูปสารประกอบอื่นๆ เช่น เกลือคลอไรด์ LiCl, KCl

●การเตรียมโลหะใช้วิธี electrolysis เกลือคลอไรด์

Alkali metal	Standard Atomic Weight (u)	Melting Point (K)	Boiling Point (K)	Density (g·cm <sup>-3</sup> )	Electronegativity (Pauling)
Lithium	6.941	453	1615	0.534	0.98
Sodium	22.990	370	1156	0.968	0.93
Potassium	39.098	336	1032	0.89	0.82
Rubidium	85.468	312	961	1.532	0.82
Cesium	132.905	301	944	1.93	0.79
Francium	(223)	295	950	1.87	0.70

- มีลักษณะอ่อน ดัดง่าย จุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ ความหนาแน่นน้อย
- นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี

5

Elements	1 <sup>st</sup> Ionization energy (kJ/mol)	2 <sup>nd</sup> Ionization energy (kJ/mol)	Standard reduction potential (V) for M <sup>+</sup> + e <sup>-</sup> → M	Radius of M <sup>+</sup> (pm)
Lithium	526	7302	-3.05	60
Sodium	502	4569	-2.71	95
Potassium	425	3058	-2.92	133
Rubidium	409	2638	-2.99	148
Cesium	382	2430	-3.02	169

- เป็น reducing agent ที่ดีที่สุด เห็นได้จากค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของอิเล็กโตรด (M<sup>+</sup>/M) มีค่าเป็นลบมาก
- Cs และ Fr เป็นธาตุที่ reactive ที่สุดในหมู่ IA
- จากค่า E<sup>0</sup> แสดงให้เห็นว่า Li ให้อิเล็กตรอนได้ดีที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับค่า IE ที่มีค่าสูง เนื่องจากค่า IE ได้มาจาก Li ในสถานะแก๊ส ส่วนค่า E<sup>0</sup> อยู่ในสารละลาย

6

Reaction	Comment
2M + X <sub>2</sub> → 2MX	X <sub>2</sub> = any halogen molecule
4Li + O <sub>2</sub> → 2Li <sub>2</sub> O	Excess oxygen
2Na + O <sub>2</sub> → Na <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	M = K, Rb, or Cs
M + O <sub>2</sub> → MO <sub>2</sub>	
2M + S → M <sub>2</sub> S	
6Li + N <sub>2</sub> → 2Li <sub>3</sub> N	Li only
12M + P <sub>4</sub> → 4M <sub>3</sub> P	M = Li, Na
2M + 2C → M <sub>2</sub> C <sub>2</sub>	
2M + H <sub>2</sub> → 2MH	
2M + 2H <sub>2</sub> O → 2MOH + H <sub>2</sub>	Violent reaction!
2M + 2H <sup>+</sup> → 2M <sup>+</sup> + H <sub>2</sub>	
2M + 2NH <sub>3</sub> → 2MNH <sub>2</sub> + H <sub>2</sub>	

- โลหะอัลคาไลสามารถระเบิดได้หากสัมผัสกับน้ำ
- สารประกอบของโลหะอัลคาไลสามารถละลายน้ำได้ เช่น NaCl, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

7

### Types of compounds formed by the alkali metals with O<sub>2</sub>

General formula	Name	Examples
M <sub>2</sub> O	Oxide	Li <sub>2</sub> O, Na <sub>2</sub> O
M <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Peroxide	Na <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
MO <sub>2</sub>	Superoxide	KO <sub>2</sub> , RbO <sub>2</sub> , CsO <sub>2</sub>

### Flame test




Li	Crimson red
Na	Yellow
K	Pale violet
Rb	Violet
Cs	bluish

8

## Diagonal relationship

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
2 <sup>nd</sup> Period	Li	Be	B	C	N	O	F
3 <sup>rd</sup> Period	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl

ความสัมพันธ์ของ Li และ Mg



- Atomic radii: Li 152 pm, Mg 160 pm
- Ionic radii: Li<sup>+</sup> 78 pm, Mg<sup>2+</sup> 78pm
- Boiling point: Li 1347°C, Mg 1090°C, other group 1 metals much lower
- Electronegativity: Li 1.0, Mg 1.3
- Lithium is much harder than the other alkali metals, more like magnesium
- Lithium does not form a peroxide, unlike other alkali metals, neither does magnesium
- Lithium hydroxide is sparingly soluble, as is magnesium hydroxide, but sodium hydroxide etc. are very soluble in water.
- Lithium forms a nitride (Li<sub>3</sub>N) as does magnesium (Mg<sub>3</sub>N<sub>2</sub>), but the other group 1 alkali metals do not.

## การนำลิเทียมไปใช้ประโยชน์

เป็นตัวต้านความร้อน เช่น แก้ว เซรามิก

ใช้ทำเครื่องบินเนื่องจากมีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาจึง

ทำลิเทียมแบตเตอรี่

เป็นส่วนผสมในอาวุธสงคราม

ใช้ในการบำบัดโรค bipolar เช่น lithium carbonate, lithium citrate, lithium orotate

เป็นตัวช่วยป้องกันการปวดไมเกรนและปวดศีรษะ

## การนำโซเดียมไปใช้ประโยชน์

- ใช้ทำสบู่โดยผสมกับกรดไขมัน ซึ่งสบู่โซเดียมมีความแข็งกว่าสบู่โปแทสเซียม

- เป็นสารเคมีที่สำคัญในอุตสาหกรรมแก้ว เหล็ก กระดาษ ปิโตรเลียม สบู่ และใยผ้า

- สารประกอบโซเดียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้แก่ common salt (NaCl), soda ash (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>), baking soda (NaHCO<sub>3</sub>), caustic soda (NaOH), sodium nitrate (NaNO<sub>3</sub>),

- ไอออนโซเดียมและไอออนโปแทสเซียมมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออวัยวะของสิ่งมีชีวิต

10

## การนำโปแทสเซียมไปใช้ประโยชน์

- ใช้ทำปุ๋ย เช่น KCl, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KNO<sub>3</sub>

- Potassium sodium tartrate หรือ Rochelle salt (KNaC<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>) เป็นองค์ประกอบหลักของผงฟู

- Potassium bromate (KBrO<sub>3</sub>) เป็น strong oxidiser ใช้เป็น flour improver (E924) เพื่อให้แป้งนุ่มฟู

- Potassium bisulfite (KHSO<sub>3</sub>) ใช้ถนอมอาหาร เช่น ไวน์ เบียร์ และใช้ฟอกหนัง

- KBr, KI และ KCl ใช้ทำ photographic emulsion เพื่อใช้ถ่ายภาพ photosensitive silver halides

## Group IIA (Alkaline earth) ns<sup>2</sup>

4	Be
	beryllium
9.012	
12	Mg
	magnesium
24.305	
20	Ca
	calcium
40.08	
38	Sr
	strontium
87.62	
56	Ba
	barium
137.3	
88	*Ra
	radium



เป็นโลหะที่ว่องไวอันดับสองรองจากหมู่ IA ความว่องไวเพิ่มขึ้นตามขนาด

ไม่พบโลหะหมู่นี้เป็นธาตุอิสระ แต่ปรากฏในรูปสารประกอบอื่นๆ เช่น

carbonate, sulphate, chloride

\* ธาตุกัมมันตรังสี

เกิดเป็นไอออนที่มีประจุ +2

11

12

Elements		Source	Method of preparation
Be	Beryllium	Beryl ( $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$ )	Electrolysis of molten $\text{BeCl}_2$
Mg	Magnesium	Magnesite ( $\text{MgCO}_3$ ), Dolomite ( $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ ) Carnallite ( $\text{MgCl}_2 \cdot \text{KCl} \cdot \text{H}_2\text{O}$ )	Electrolysis of molten $\text{MgCl}_2$
Ca	Calcium	Various minerals containing $\text{CaCO}_3$	Electrolysis of molten $\text{CaCl}_2$
Sr	Strontium	Celestite ( $\text{SrSO}_4$ ), Strontianite ( $\text{SrCO}_3$ )	Electrolysis of molten $\text{SrCl}_2$
Ba	Barium	Baryte ( $\text{BaSO}_4$ ) Witherite ( $\text{BaCO}_3$ )	Electrolysis of molten $\text{BaCl}_2$
Ra	Radium	Pitchblende (1g of Ra / 7 tons of ore)	Electrolysis of molten $\text{RaCl}_2$

การเตรียมโลหะใช้วิธี electrolysis แก่ลือคลอไรด์ที่หลอมเหลว

13

Alkali Earth	Standard Atomic Weight (u)	Melting Point (K)	Boiling Point (K)	Density ( $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ )	Electronegativity (Pauling)
Beryllium (Be)	9.012	1280	1500	1.86	1.57
Magnesium (Mg)	24.305	651	1107	1.75	1.31
Calcium (Ca)	40.078	851	1440	1.55	1.00
Strontium (Sr)	87.62	800	1366	2.6	0.95
Barium (Ba)	137.327	850	1537	3.59	0.89
Radium (Ra)	226.0	295	950	1.87	0.9

14

Elements	1 <sup>st</sup> Ionization energy (kJ/mol)	2 <sup>nd</sup> Ionization energy (kJ/mol)	3 <sup>rd</sup> Ionization energy (kJ/mol)	Standard reduction potential (V) for $\text{M}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{M}$	Radius of $\text{M}^{2+}$ (pm)
<b>Be</b>	906	1763	14855	-1.70	$\approx 30$
<b>Mg</b>	744	1457	7739	-2.37	65
<b>Ca</b>	596	1152	4913	-2.76	99
<b>Sr</b>	556	1071	4210	-2.89	113
<b>Ba</b>	509	972	-	-2.90	135
<b>Ra</b>	509	979	-	-2.92	140

15

แนวโน้มการละลายน้ำของสารประกอบหมู่ IIA

	$\text{SO}_4^{2-}$	$\text{CO}_3^{2-}$	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	$\text{CrO}_4^{2-}$	$\text{OH}^-$	$\text{F}^-$
$\text{Be}^{2+}$	มาก	มาก	มาก	มาก	น้อย	น้อย
$\text{Mg}^{2+}$	↑	↑	↑	↑	↓	↓
$\text{Ca}^{2+}$						
$\text{Sr}^{2+}$						
$\text{Ba}^{2+}$	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย	มาก	มาก

ธาตุหมู่ IIA จัดเป็นธาตุที่ว่องไว ความว่องไวจะเพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมสูงขึ้น ยกเว้น Be ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำแม้จะใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้น



16

Reaction	Comment
$M + X_2 \longrightarrow MX_2$	$X_2 =$ any halogen molecule
$M + O_2 \longrightarrow 2MO$	Ba gives $BaO_2$ as well
$M + S \longrightarrow MS$	
$3M + N_2 \longrightarrow M_3N_2$	High temperatures
$6M + P_4 \longrightarrow 2M_3P_2$	High temperatures
$M + H_2 \longrightarrow MH_2$	$M =$ Ca, Sr, or Ba; high temperatures
	Mg at high pressure
$M + 2H_2O \longrightarrow M(OH)_2 + H_2$	$M =$ Ca, Sr, or Ba
$Mg + 2H_2O \longrightarrow MgO + H_2$	High temperature, Except Be
$M + 2H^+ \longrightarrow M^{2+} + H_2$	
$Be + 2OH^- + 2H_2O \longrightarrow Be(OH)_4^{2-} + H_2$	Be only
$M + 2NH_3 \longrightarrow M(NH_2)_2 + H_2$	$M =$ Ca, Sr, Ba, liq. $NH_3$ included catalyst
$3M + 2NH_3 \longrightarrow M_2N_2 + 3H_2$	$NH_3$ gas, high temperature



17

### ความสัมพันธ์เชิงเส้นทแยงมุมของ Be และ Al

$BeO$  และ  $Al_2O_3$  เป็น amphoteric (แต่ oxides ของ Group 2 เป็น basic)



สารประกอบไฮไลด์ของ Be และ Al เช่น  $BeCl_2$  และ  $AlCl_3$  เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน



18

**Beryllium** ใช้เป็น p-type dopant ใน semiconductors ของสารประกอบของธาตุหมู่ IIIA

#### การนำ Mg ใช้ประโยชน์

$MgO$ : ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก แก้ว ซีเมนต์ การเกษตร สารเคมีต่างๆ อุตสาหกรรมก่อสร้าง กระป๋องเครื่องดื่ม (aluminium-magnesium alloys)

$Mg^{2+}$  จำเป็นต่อร่างกายดังนั้นจึงมีการเติมลงไปในการอาหาร นู๋

$Mg$  เป็นองค์ประกอบใน chlorophyll

Magnesium salicylate และ Magnesium sulfate ใช้เป็นยา antiseptics.

#### การนำ Ca ใช้ประโยชน์

- เป็น reducing agent ในการสกัดโลหะเช่น uranium, zirconium, and thorium.
- เป็น deoxidizer, desulfurizer, decarbonizer สำหรับโลหะผสมที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก
- เป็น alloying agent ในการผลิต aluminium, beryllium, copper, lead, magnesium alloy
- ใช้ทำ cements และ mortars ในการก่อสร้าง
- ใช้ทำ cheese



### Group IIIA (Triel element) $ns^2 np^1$



Boron (B)



Aluminum (Al)



Indium (In)



Gallium (Ga)

B, Al, Ga และ In มีเลขออกซิเดชัน +3

Tl มีเลขออกซิเดชันคือ +1 และ +3 เนื่องจากมีขนาดใหญ่

B เป็นกึ่งโลหะ มีลักษณะโคเวเลนต์มากกว่าไอออนิก

Al เป็นโลหะที่มีมากที่สุดบนผิวโลกของสารประกอบ  $KAlSi_3O_8$ ,  $Al_2O_3$

Al, Ga และ In มีออกไซด์เคลือบผิว ทำให้เฉื่อย ทำให้ไม่ละลายใน  $HNO_3$  ที่เป็นตัวออกซิไดซ์ แต่ละลายในกรดที่ไม่เป็นตัวออกซิไดซ์ (ยกเว้น Tl)

Elements		Source	Method of preparation
B	Boron	Kernite, a form of borax ( $Na_2B_4O_7 \cdot 4H_2O$ )	Reduction by Mg or $H_2$
Al	Aluminum	$Al_2O_3$ , $KAlSi_3O_8$	Electrolysis of $Al_2O_3$ in molten $Na_3AlF_6$
Ga	Gallium	Traces in various minerals	Reduction with $H_2$ or electrolysis
In	Indium	Traces in various minerals	Reduction with $H_2$ or electrolysis
Tl	Thallium	Traces in various minerals	Electrolysis


20

Elements	Ionization energy (kJ/mol)	Standard reduction potential (V) for $M^{3+} + 3e^- \longrightarrow M$	Radius of $M^{3+}$ (pm)
Boron	798	-	20
Aluminum	581	-1.66	50
Gallium	577	-0.53	62
Indium	556	-0.34	81
Thallium	589	0.72	95

21



Reaction	Comment
$2M + 3X_2 \longrightarrow 2MX_3$	$X_2$ = any halogen molecule, Tl gives TlX as well, but no TlX <sub>3</sub>
$4M + 3O_2 \longrightarrow 2M_2O_3$	High temperatures; Tl gives Tl <sub>2</sub> O <sub>2</sub> as well High temperatures; Tl gives Tl <sub>2</sub> S <sub>2</sub> as well
$2M + 3S \longrightarrow M_2S_3$	
$2M + N_2 \longrightarrow 2MN$	M = Al only
$2M + 6H^+ \longrightarrow 2M^{3+} + 3H_2$	M = Al, Ga, or In; Tl gives Tl <sup>+</sup>
$2M + 2OH^- + 6H_2O \longrightarrow 2M(OH)_4^{2-} + 3H_2$	M = Al or Ga

- เกลือซัลเฟต ในกรดและเฮไลด์ของโลหะหนักนี้ละลายน้ำได้ดี
- ไฮดรอกไซด์โลหะหนักนี้ไม่ละลายน้ำ
- ออกไซด์และไฮดรอกไซด์ของ Al และ Ga มีสมบัติเป็น amphoteric



22

$B_2O_3$  (boron oxide) เป็นออกไซด์ที่มีความเป็นกรด เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ



**Trihydroxidoboron (boric acid)  $H_3BO_3$**

**ความสัมพันธ์เชิงเส้นทแยงมุมของ B (หมู่ IIIA) และ Si (หมู่ IVA)**

- Atomic radii: B 88 pm, Si 117 pm
- เป็นอโลหะ
- เกิดเป็น acidic oxide อย่างอ่อน
- เป็น semiconductor

23


**การนำ Boron ใช้ประโยชน์**



Borosilicate glassware เช่น beakers และ test tube



Boron carbide ใช้เป็นแผ่นกันกระสุนในเสื้อกันกระสุน



Dopant ใน semiconductor

**การนำ Aluminium ใช้ประโยชน์**








เป็นวัสดุทำ automobiles, aircraft, trucks, railway cars, marine vessels, bicycles



Packaging (cans, foil)

24

Group IVA (Tetrel element)  $ns^2 np^2$


6 <b>C</b> carbon (12.01, 12.02)	
14 <b>Si</b> silicon (28.09, 28.09)	Carbon (graphite) Carbon (diamond)
32 <b>Ge</b> germanium 72.64	
50 <b>Sn</b> tin 118.7	
82 <b>Pb</b> lead 207.2	
114 <b>Fl</b> flerovium	

หมู่ Group IVA แบ่งได้เป็น 3 classes:

- Carbon เป็น nonmetal
- Silicon และ Germanium เป็น semimetal
- Tin และ Lead เป็น metals

(ความเป็นโลหะเพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมสูงขึ้น)

- เลขออกซิเดชัน เป็น +4 และ +2 (เฉพาะ Sn และ Pb เท่านั้น)




Elements	Source	Method of preparation
C	Carbon	Graphite, diamond, petroleum, coal
Si	Silicon	Silicate minerals, silica
Ge	Germanium	Germinate (mixture of Cu, Fe, and GeS <sub>2</sub> )
Sn	Tin	Cassiterite (SnO <sub>2</sub> )
Pb	Lead	Galena (PbS)

Elements	Electronegativity	Melting point (°C)	Boiling point (°C)
Carbon	2.5	3727	-
Silicon	1.8	1410	2355
Germanium	1.8	937	2830
Tin	1.8	232	2270
Lead	1.9	327	1740


Reaction	Comment
$M + 2X_2 \rightarrow MX_4$	$X_2 = \text{any halogen molecule};$ $M = \text{Ge or Sn}; \text{Pb gives } PbX_2$
$M + O_2 \rightarrow MO_2$	$M = \text{C, Si}$ $M = \text{Ge or Sn}; \text{high temperature,}$ $\text{Pb gives } PbO \text{ or } Pb_3O_4$
$M + 2H^+ \rightarrow M^{2+} + H_2$	$M = \text{Sn or Pb}$
$M + OH^- + 2H_2O \rightarrow M(OH)_3^{2-} + H_2$	ปฏิกิริยาเกิดช้า
$Ge + 2OH^- + 4H_2O \rightarrow Ge(OH)_6^{2-} + 2H_2$	

- ออกไซด์ของคาร์บอนมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  
 $CO_2 (g)$  ละลายน้ำแล้วได้กรด  $H_2CO_3 (liq)$
- ออกไซด์ของธาตุอื่น ๆ มีสถานะเป็นของแข็ง  
 $CaO (s)$  เตรียมโดย  $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

- รูป (form) ของคาร์บอน



- ออกไซด์ของซิลิกอน คือ ซิลิกา (SiO<sub>2</sub>) อยู่ในรูป quartz และทราย



ในการก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคอนกรีตและก้อนอิฐ

ใช้ทำแก้วและฉนวน ใช้เป็นวัสดุทำขัดหรือเจียรไนเพชร

ใช้ทำวัสดุอุดรู โดยผสม boric acid กับ silicone oil

## Group VA ( $ns^2 np^3$ ) (Pnicogens)

N	nonmetal	$\downarrow$ <b>increasing                  metallic                  character</b>
P		
As	metalloid (semiconductor)	
Sb		
Bi	metal	



เลขออกซิเดชัน = +3 และ +5

N อยู่ในรูปของแก๊สและของเหลวที่อุณหภูมิต่ำ

P มีหลายอัญรูป เป็นของแข็ง



• ฟอสฟอรัสขาว ลูกคิดไฟในบรรยากาศของ  $O_2$

• ฟอสฟอรัสแดง ได้จากการเผาฟอสฟอรัสขาวทำปฏิกิริยากับ  $O_2$  ที่อุณหภูมิสูง



• ฟอสฟอรัสดำ ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูง

29

Elements	Source	Method of preparation
Nitrogen	Air	Liquefaction of air
Phosphorus	Phosphate rock $[Ca_3(PO_4)_2]$ Fluorapatite $[Ca_5(PO_4)_3F]$	$2Ca_3(PO_4)_2 + 6SiO_2 \rightarrow 6CaSiO_3 + P_4O_{10}$ $P_4O_{10} + 10C \rightarrow 4P + 10CO$
Arsenic	Arsenopyrite ( $Fe_3As_2$ , FeS)	Heating arsenopyrite in the absence of air
Antimony	Stibnite ( $Sb_2S_3$ )	Roasting $Sb_2S_3$ in air to form $Sb_2O_3$ and then reduction with C
Bismuth	Bismite ( $Bi_2O_3$ ), Bismuth glance ( $Bi_2S_3$ )	Roasting $Bi_2S_3$ in air to form $Bi_2O_3$ and then reduction with C



Phosphate rock



Fluorapatite



Arsenopyrite



Stibnite



Bismite


30

Elements	Ionization energy (kJ/mol)	Electronegativity	Melting point ( $^{\circ}C$ )	Boiling point ( $^{\circ}C$ )
N Nitrogen	1402	3.0	-210	-195.79
P Phosphorus	1012	2.1	44.2 (white) 610 (black)	280.5 (white)
As Arsenic	947	2.0		
Sb Antimony	834	1.9		
Bi Bismuth	703	1.9		


31

## ปฏิกิริยาที่สำคัญ


1. ใช้ไนโตรเจนในกระบวนการ Haber process ภายใต้อุณหภูมิสูงและมีตัวเร่ง



2. Nitrogenfixation :  $N_2 \rightarrow$  various products



3. กระบวนการ Ostwald process ที่เปลี่ยน  $NH_3$  ไปเป็น  $NO, NO_2, HNO_3$








32





Oxidation state of nitrogen	compound	formula
-3	Ammonia	NH <sub>3</sub>
-2	Hydrazine	N <sub>2</sub> H <sub>4</sub>
-1	Hydroxylamine	NH <sub>2</sub> OH
0	Nitrogen	N <sub>2</sub>
+1	Dinitrogen monoxide (nitrous oxide)	N <sub>2</sub> O
+2	Nitrogen monoxide	NO
+3	(nitric oxide)	
	Dinitrogen trioxide	N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
+4	Nitrogen dioxide	NO <sub>2</sub>
+5	Nitric acid	HNO <sub>3</sub>

33

### Group VIA (ns<sup>2</sup> np<sup>4</sup>) (Chalcogens)

8 O		liquid oxygen with bubbles of oxygen gas • ธาตุในหมู่นี้ไม่เกิดเป็นสารประกอบในรูปของแคทไอออนอะตอมเดี่ยว (M <sup>+</sup> ) แต่เกิดเป็น polyatomic cation เช่น O <sub>2</sub> <sup>+</sup> และ S <sub>8</sub> <sup>+</sup>
16 S		
34 Se		
52 Te		
84 Po		

dioxygenyl                      S<sub>8</sub><sup>+</sup> crown

• ยกเว้น Po เกิดเป็นแคทไอออนอะตอมเดี่ยว (M<sup>+</sup>) ได้

34

Elements		Source	Method of preparation
O	Oxygen	Air	Distillation from liquid air
S	Sulfur	Sulfur deposits	Melted with hot water and pumped to the surface
Se	Selenium	Impurity in sulfide ores	Reduction of H <sub>2</sub> SeO <sub>4</sub> with SO <sub>2</sub>
Te	Tellurium	Nagyagite (mixed sulfide and telluride)	Reduction of ore with SO <sub>2</sub>
Po	Polonium	Pitchblends	





35

Elements	Electronegativity	Radius of X <sup>2-</sup> (pm)	Melting point (°C)	Boiling point (°C)
Oxygen	3.5	140	-218.79	-182.95
Sulfur	2.5	184	115.21	444.6
Selenium	2.4	198	221	685
Tellurium	2.1	221		
Polonium	2.0	230	254	962

Oxides	Hydrides	Halogen compounds
PoO <sub>2</sub>	PoH <sub>2</sub>	PoX <sub>2</sub> เช่น PoCl <sub>2</sub>
PoO <sub>3</sub>		PoX <sub>4</sub>
		PoX <sub>6</sub>

36

## The chemistry of oxygen



oxidation state of oxygen

-2 oxide

-1 peroxides.

uncommon:

-1/2 (superoxides),


-1/3 (ozonides),

0 (elemental, hypofluorous acid)

+1/2 (dioxygenyl),

+1 (dioxygen difluoride)

+2 (oxygen difluoride)



ในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของน้ำสามารถผลิตก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน

electrolysis of water

37

Oxidation state of sulfur	Compounds
+6	SO <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , SF <sub>6</sub>
+4	SO <sub>2</sub> , HSO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> , SF <sub>4</sub>
+2	SO
0	S <sub>8</sub> and all other forms of elemental sulfur
-2	H <sub>2</sub> S, S <sup>2-</sup>

S<sup>2-</sup> Sulfides

SF<sub>6</sub> Sulfur hexafluoride

SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> Sulfites

H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> Sulfurous acid


SO<sub>2</sub> Sulfur dioxide

SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> Sulfates

S<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>2-</sup> Thiosulfates

SCN<sup>-</sup> Thiocyanates

S<sub>4</sub>N<sub>4</sub> Tetrasulfur tetranitride



Sodium hydrosulfite  
(sodium dithionite)  
สารฟอกขาว



38

## Group VIIA, Halogen (ns<sup>2</sup> np<sup>5</sup>)

Elements	Source	Method of preparation
F Fluorine	Fluor spar (CaF <sub>2</sub> ), cryolite (Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> ), fluorapatite [Ca <sub>5</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> F]	Electrolysis of molten KHF <sub>2</sub>
Cl Chlorine	Rock salt (NaCl), halite (NaCl), sylvite (KCl)	Electrolysis of aqueous NaCl
Br Bromine	Seawater, brine wells	oxidation of Br <sup>-</sup> by Cl <sub>2</sub>
I Iodine	Seaweed, brine wells	Oxidation of I <sup>-</sup> by electrolysis or MnO <sub>2</sub>
As Astatine		

• เลขออกซิเดชัน = -1, +1, +3, +5, +7

ยกเว้น F มีเลขออกซิเดชัน = -1 เท่านั้น

• ทั้งหมดเป็นอโลหะ และ At เป็นธาตุกัมมันตรังสี


39

Elements	E.N.	Radius of X <sup>-</sup> (pm)	Standard reduction potential (V) for X <sub>2</sub> + 2e <sup>-</sup> → 2X	Melting point (°C)	Boiling point (°C)	Bond energy of X <sub>2</sub> (kJ/mol)
Fluorine	4.0	136	2.87	-220	-188	154
Chlorine	3.0	181	1.36	-101	-34	239
Bromine	2.8	195	1.09	-7.3	59	193
Iodine	2.5	216	0.54	113	184	149
Astatine	2.2	-	-			-

• Halogen เกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแบบ monovalent ion ที่เป็น anion



• F<sub>2</sub> ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเพราะมีค่า EN สูงที่สุด

• F<sub>2</sub> เป็น oxidizing agent ที่ดี



40


### Hydrogen halides



strongest acid

weakest acid

HX	H-X bond energy (kJ/mol)	d(H-X) (pm) gas phase
HF	565	91.7
HCl	427	127.4
HBr	363	141.4
HI	295	160.9



F<sub>2</sub> มีสมบัติทางเคมีแตกต่างไปจาก halogen อื่นๆ ดังนี้

1. F<sub>2</sub> มีความไวต่อปฏิกิริยามากที่สุด
2. พลังงานพันธะ F-F แข็งแรงน้อยกว่า Cl-Cl เนื่องจากอะตอม F มีขนาดเล็ก อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทั้งสามคู่จึงอยู่ใกล้กันมากและผลกกันได้แรงกว่าใน Cl<sub>2</sub> ซึ่งมีอะตอมใหญ่กว่า
3. HF มีจุดเดือดสูง (19.5 °C) เนื่องจากเกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงระหว่างโมเลกุล แต่ไฮโดรเจนเฮไลด์อื่นมีจุดเดือดต่ำกว่ามาก เช่น HCl มีจุดเดือด -85.1 °C
4. HF เป็นกรดอ่อนแต่กรดไฮโดรเฮลิกอื่น เช่น HCl, HBr และ HI เป็นกรดแก่
5. AgF ละลายน้ำได้ แต่ซิลเวอร์เฮไลด์อื่นๆ ไม่ละลายน้ำ

Compound Solubility (g / 100 g H<sub>2</sub>O)

AgF	172
AgCl	0.00019
AgBr	0.000014
AgI	0.000003

42

### Interhalogen

XY<sub>n</sub>, where n = 1, 3, 5 or 7

(X is the less electronegative of the two halogens).

	F	Cl	Br	I
F	F <sub>2</sub>			
Cl	ClF, ClF <sub>3</sub> , ClF <sub>5</sub>	Cl <sub>2</sub>		
Br	BrF, BrF <sub>3</sub> , BrF <sub>5</sub>	BrCl	Br <sub>2</sub>	
I	IF, IF <sub>3</sub> , IF <sub>5</sub> , IF <sub>7</sub>	ICl, I <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>	IBr	I <sub>2</sub>

43

sodium fluoride (NaF), stannous fluoride (SnF<sub>2</sub>) และ sodium MFP ใช้ทำยาสีฟันเพื่อป้องกันฟันผุ

Brominated vegetable oil (BVO) ใช้เป็น emulsifier ใน citrus-flavored soft drinks เช่น Mountain Dew, Gatorade, Powerade, Pineapple and Orange Fanta, Orange Crush, Sun Drop, Squirt และ Fresca เพื่อช่วยให้ natural fat-soluble citrus flavors กระจายตัวในน้ำดื่ม

โบรมีนมีประโยชน์ในการเตรียม ethylene dibromide (BrCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>Br) ซึ่งใช้เป็นยาฆ่าแมลง และใช้ในการกำจัดตะกั่วในน้ำมันรถยนต์เพื่อไม่ให้มีตะกั่วเข้าไปอุดตันในเครื่องยนต์ แต่สารนี้เป็นสารก่อมะเร็ง

โบรมีนรวมตัวกับเงินได้โดยตรง เกิดเป็น AgBr ซึ่งใช้ในการทำฟิล์มถ่ายรูป

ไอโอดีน เป็นส่วนประกอบสำคัญของไทรอยด์ฮอร์โมนชื่อ thyroxine

ถ้าร่างกายขาดไอโอดีนอาจทำให้ต่อมไทรอยด์บวม ซึ่งไอโอดีนใช้ผลิตไทรอกซินในร่างกาย ทิงก์เจอร์ไอโอดีน (tincture iodine) ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค มีไอโอดีน 2-7%, potassium iodide หรือ sodium iodide ละลายในน้ำและแอลกอฮอล์

44

O.S	Name	Formula	Example compounds
-1	chlorides	Cl <sup>-</sup>	ionic chlorides, organic chlorides, hydrochloric acid
0	chlorine	Cl <sub>2</sub>	elemental chlorine
+1	hypochlorites	ClO <sup>-</sup>	sodium hypochlorite, Calcium hypochlorite
+3	chlorites	ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Sodium chlorite
+5	chlorates	ClO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	sodium chlorate, potassium chlorate, chloric acid
+7	perchlorates	ClO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	Potassium perchlorate, Perchloric acid, Magnesium perchlorate ammonium perchlorate



45

## Group VIIIA , Noble gas (ns<sup>2</sup> np<sup>6</sup>)

- ธาตุในหมู่นี้เฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมี เพราะมีอิเล็กตรอนครบ 8 ตัว
- ธาตุที่มีขนาดใหญ่ และมีค่า EN ต่ำๆ สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ เช่น Xe

Elements		IE (kJ/mol)	OS.	Density (g/cm <sup>3</sup> )	mp. (°C)	bp. (°C)	Atmospheric abundance (% by V)	Example of compound
He	Helium	2372	0	1.8×10 <sup>-4</sup>	-270	-269	5 × 10 <sup>-4</sup>	None
Ne	Neon	2080	0	9.0×10 <sup>-4</sup>	-249	-246	1 × 10 <sup>-3</sup>	None
Ar	Argon	1520	0	1.8×10 <sup>-3</sup>	-189	-186	9 × 10 <sup>-1</sup>	None
Kr	Krypton	1351	+2	3.7×10 <sup>-3</sup>	-157	-153	1 × 10 <sup>-4</sup>	KrF <sub>2</sub>
Xe	Xenon	1170	+2, +4, +6, +8	5.9×10 <sup>-3</sup>	-112	-107	9 × 10 <sup>-6</sup>	XeF <sub>4</sub> , XeO <sub>3</sub> , XeF <sub>6</sub>

46

### Helium

ใช้เป็นแก๊สในบอลูนเนื่องจากฮีเลียมมีความหนาแน่นต่ำและการเผาไหม้ต่ำ

ฮีเลียมเหลวใช้เป็นสารหล่อเย็นในเครื่อง MRI scanners มีน้ำหนักน้อยกว่าอากาศ ไม่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

มีปริมาณมากเป็นธาตุอันดับสองรองจากไฮโดรเจน มีความปลอดภัยสูง ไม่เกิดการเผาไหม้ หากมีการสูดดมแก๊สฮีเลียมเข้าไป เสียงจะแหบ



### Neon

ไม่มีสี เฉื่อยภายใต้สภาวะปกติ

นีออนให้สีส้มแดงเมื่อใช้กับ discharge tube และหลอดนีออน

### Argon



เป็นแก๊สเฉื่อยราคาถูก มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ การเก็บ Cs ในบรรยากาศของก๊าซอาร์กอน

47

### Krypton

เป็นแก๊สเฉื่อยที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ใช้บรรจุในหลอดฟลูออเรสเซนต์



Krypton laser "excimer" lasers

### Xenon



Xe-lighting



- ภาพ tomography (ภาพเอ็กซเรย์) ของหัวใจ ปอด และสมองที่เกิดจากการปลดปล่อยรังสีแกมมาของ <sup>133</sup>Xe ของธาตุซีนอน
- <sup>133</sup>Xe ของธาตุซีนอน ใช้วัดการไหลของเลือด

48